

Il est donné lecture d'une note du R. P. Longin Navas : *Névroptères des bords de la Meuse et de la Molignée*. L'impression en est décidée.

M. le président Poëkin, nous entretient ensuite sur l'entomologie appliquée.
La séance est levée à 18 heures 30

Le Secrétaire,
C. VREURICK

Errata. — N° de Septembre 1910

- p. 66, ligne 21, lire var. *Obscurior* Sel., peu c.
" " 29, au lieu de *Notodonta* lire *Leucodonta*.
p. 67, " 10, " Kusch. " Knoch.
" " 22, " *Anasistis* " *Anaitis*.
" " 23, " *C. Carpinata* lire *Lobophora Carpinata*.
-

Névroptères des bords de la Meuse et de la Molignée (Namur).

par le R. P. LONGIN NAVAS, S. J.

J'avais eu l'honneur d'assister au I^{er} congrès d'entomologie de Bruxelles (1-6 août 1910) et pour me rendre au VIII^e congrès de zoologie de Graz (15-20 août) il me fallait passer par Namur. S'il n'avait pas fallu j'aurais choisi ce passage pour causer avec mes amis et collègues de cette région namuroise.

NAMUR. - Le jour même de la clôture du congrès, samedi 6, je prends le train pour Namur; avant midi je serre la main à mon ami M. Tonglet, le soir j'ai le bonheur de faire une visite à Jambes à mon ami M. Lambillion et avec lui une courte excursion entomologique aux bords de la Meuse. Malgré le temps pluvieux et la pluie qui tombe à notre retour, j'ai eu la fortune de trouver quelques espèces intéressantes.

WARNANT. — Le dimanche 7 nous partons, M. Tonglet et moi, par le train de 8 h. 10 pour Yvoir. Le jour était si beau qu'on n'avait eu rien d'égal depuis des mois. Arrivés à la gare nous partons à pied, et laissant Warnant à la droite, nous explorons les arbres et les arbustes des bords de la route et de la rivière la Molignée, tantôt fauchant avec le filet; tantôt battant les branches et recevant la récolte dans le filet tenu à rebours en guise de parasol. L'espace parcouru depuis les premiers essais n'a été que d'environ deux kilomètres, mais la récolte a surpassé mon espoir.

MAREDSOUS. — L'abbaye de Maredsous, monument visité de tant de touristes, était le but d'une excursion d'un autre genre : la chasse aux Névroptères. J'avais fait la connaissance du R. P. Dom Guy de Hennin au congrès d'entomologie de Bruxelles et, à ses instances, j'avais promis de lui faire une courte visite, si je pouvais disposer de quelque temps avant mon départ. A dire vrai j'avais peu d'espoir de réaliser ma promesse, et pour tenir ma parole j'ai dû sacrifier mon excursion à Anvers fixée pour le samedi 6, en prenant la direction contraire. Je n'ai qu'à me féliciter de ce

changement, qui m'a permis d'ajouter un des plus beaux jours à mon voyage. M. Lambillion a voulu m'accompagner, ajoutant ainsi une double joie à l'excursion par son aimable compagnie et par sa conversation intéressante à l'al'ér et au retour. Encore avant de quitter Namur un dernier adieu et un étroit serrement de main à mon ami, M. Tonglet qui m'attendait en face de la gare.

Il serait trop long de dire ici les impressions reçues à l'arrivée à la magnifique abbaye et à la vue des belles collections du P. de Hennin. J'admire là sa belle collection de la faune lépidoptérologique de Belgique et des autres insectes exotiques, j'en reçois quelques Névroptères, en partie comme don gracieux et en partie pour la détermination

Après dîner, le P. de Hennin nous accompagne et chemin faisant on essaye la chasse. Elle n'a été qu'un essai pour les Névroptères, à poursuivre assidûment, je l'espère, par le R. P. de Hennin.

Le temps nous manquait pour nous arrêter longtemps. Dire un dernier adieu au R. P. de Hennin, dont le souvenir me sera doux toujours. M. Lambillion et moi nous prenons à Sosoye le train de 2 h. 36 pour Dinant et de là pour Namur, d'où je devais partir le lendemain matin pour continuer mon voyage

*
* *

L'indélébile souvenir de ces jours-là je suis heureux de l'extérioriser dans la *Revue Namuroise d'Entomologie*.

Les localités visitées étant voisines, il vaudra mieux énumérer ensemble toutes les espèces capturées, en notant pourtant la localité. Je ne mentionnerai que les Névroptères, et j'ajouterai à la liste quelques Odonates pris quelques jours auparavant par le R. P. de Hennin à Molenstède-lez-Diest et cédés généreusement pour ma collection.


Quelques-unes des espèces que je vais énumérer sont assez fréquentes; mais la région et l'époque de l'année où elles ont été prises sont toujours de quelque intérêt pour la faune entomologique de Belgique.

Voici donc l'énumération par ordre de familles :

- Æschnides.** *Æschna cyanea* Müll. Molenstède
Agrionides. — *Enallagma cyathigerum* Charp. Molenstède.
Ischnura elegans Van der Linden Molenstède.
Ephémérides. — *Baetis binoculatus* L. Warnant Fréquent.
Ephemerella ignita Poda Warnant Plusieurs échantillons.
Thraululus bellus Etn. Warnant. Probable. Un échantillon ♀ un peu défectueux. Ce serait une espèce et un genre nouveaux pour la Belgique. Il est à rechercher.
Osmylides *Osmylus fulvicephalus* Scop. (= maculatus F.) Warnant.
Hémérobides. *Hemerobius micans* Oliv. Maredsous.
— *humuli* L. Maredsous
Chrysopides. — *Chrysopa vulgaris* Schn. Warnant.
— — var. *namurensis* nov.
Similis var *biseriatae* Schumm.

A typo differt :

Facies puncto grandi ad genas ante oculos, stria ad clypei latera, nigris;



Chrysopa vulgaris Schn. var. *namurcensis* Nav.

a. Prothorax, vu de dessus

b. Abdomen, vu de côté.

palpis maxillaribus pænultimo articulo externe fusco; vertice viridi, occipite macula flava

Prothorace (a) lateribus linea nigra, disco stria obliqua pone sulcum posticum fusca.

Abdomine (b) linea laterali ad suturam, præterea linea obliqua laterali in tergitis intermediis.

Alis pilis nigris brevibus rarisque. Ala anteriore radio ad basim stria fusca notato, ut in varietate *radiali* Nav.; sectore cubiti initio, venula cubitali tota nigris. Ala posteriore venulis costalibus ad eubcostam, venulis radialibus et sectore radii ad radium nigro pictis.

Un échantillon aux bords de la Meuse, à Jambes, près Namur, d'où le nom de *namurcensis*

Conioptérygides. — *Coniopteryx tineiformis* Curt. Warnant.

Panorpidés. — *Panorpa communis* L. Warnant.

— *germanica* L. Warnant.

— *cognata* Ramb. Warnant

Psocides. — *Psocus nebulosus* Steph. Maredsous.

Stenopsocus immaculatus Steph. Warnant.

Graphopsocus cruciatus L. Warnant.

Cecilius fluvidus Steph. Warnant, Maredsous.

Pterodela pedicularia L. Warnant.

Peripsocus subpupillatus Mac Lachl. Warnant. Abondant

Imnophilides — *Glyphotælius pellucidus* Retz. Molenstède.

Stenophylax luctuosus Piller. ♂. Warnant. A remarquer la localité et aussi les pupilles, dont l'externe très visible aux deux ailes, placées à l'axille de la 2^e fourche apicale.

Odonocerides. — *Odontocerum albicorne* Scop. Warnant.

Sériceos omides. — *Lasiocephala basalis* Kol. Warnant, Maredsous. Commun.

Leptocérids — *Leptocerus aterrimus* Steph. Jambes

Homilia leucophæa Ramb. Jambes.

Hydropsychides. — *Hydropsyche instabilis* Curt. Warnant.

Psychomyides. — *Tinodes Veneri* L. Warnant.

Hydroptilids — *Hydroptila sparsa* Curt. Warnant.

Saragosse, Collège du Sauveur, 30 septembre 1910.

Variétés et aberrations de Lépidoptères.

Erebia Medusa F. ab ♀ **Amazon** Cab. (n. ab.). — Dessus des quatre ailes d'un brun noir foncé, avec les bandes ordinaires d'un fauve rougeâtre brillant comme dans le ♂. Les yeux noirs sont bien formés aux quatre ailes et